

Kính gửi: Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn.

Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhiệm vụ Y tế Dự phòng, phòng chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm và dinh dưỡng cộng đồng. Nhằm tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng chống suy dinh dưỡng; phòng chống các bệnh giun sán cho trẻ em trên địa bàn huyện. Gắn kết hoạt động truyền thông phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu chất dinh dưỡng với các hoạt động truyền thông về dinh dưỡng hợp lý, sử dụng thực phẩm an toàn, phòng tránh các bệnh không lây nhiễm.

Thực hiện công văn số 3057/SYT - NVY ngày 31/10/2019 của Sở y tế tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức chiến dịch uống bổ sung VitaminA và tẩy giun đợt II năm 2019. Giám đốc Trung tâm Y tế Thiệu Hóa yêu cầu trưởng trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Lập kế hoạch, tổ chức triển khai báo cáo UBND xã, thị trấn về việc tổ chức uống bổ sung VitaminA và tẩy giun đợt II năm 2019 trên địa bàn xã.
2. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn về mục đích ý nghĩa và sự cần thiết của việc uống bổ sung vitamin A và tẩy giun định kỳ cho đối tượng. Thông báo thời gian và địa điểm uống thuốc về gia đình.
3. Khảo sát, lập danh sách đối tượng: trẻ từ 6 – 60 tháng tuổi uống Vitamin A; các bà mẹ sau sinh trong vòng một tháng, trẻ có nguy cơ cao (tiêu chảy kéo dài, suy dinh dưỡng nặng, nhiễm khuẩn hô hấp và trẻ mắc bệnh sỏi) và trẻ từ 24-60 tháng tuổi uống thuốc tẩy giun. Báo cáo tổng số đối tượng về TTYT Thiệu Hóa trước ngày 10/11/2019.
4. Thời gian, địa điểm và nội dung triển khai.

Thời gian: triển khai đồng loạt tại 28 xã, thị trấn ngày 01-02/12/2019.

Địa điểm: tại Trạm Y tế hoặc nhà Văn hóa thôn.

4.1. Uống Vitamin A

- * Liều uống viên nang Vitamin A:
 - Trẻ từ 6-12 tháng tuổi uống một viên màu xanh (tương đương 100.000 IU);
 - Trẻ từ 13-60 tháng tuổi và các bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng uống một viên màu đỏ (tương đương 200.000 IU);

4.2. Uống thuốc tẩy giun.

* Liều uống: Mỗi trẻ 24-60 tháng tuổi chỉ uống 1 viên **Mebendazol 500mg** duy nhất trong đợt.

* **Chỉ định:**

- Trẻ được sự đồng ý của phụ huynh mới cho uống thuốc tẩy giun.
- Trẻ từ 24-60 tháng tuổi chưa uống thuốc tẩy giun trong vòng 06 tháng
- Trẻ phải được ăn trước khi uống thuốc 30 phút.
- Mỗi điểm uống thuốc chuẩn bị đầy đủ nước, đường cho trẻ.

* **Chống chỉ định:**

- Các trường hợp mẫn cảm, dị ứng với thuốc Mebendazol
- Trẻ đang sốt, đang mắc các bệnh nhiễm trùng
- Trẻ đau bụng, rối loạn tiêu hóa và đang mắc các bệnh cấp tính – mãn tính khác.

4.3. Tổ chức cân trẻ và lập danh sách theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho trẻ từ 0 – 60 tháng tuổi.

5. Trạm y tế cử cán bộ nhận thuốc VitaminA và thuốc tẩy giun vào ngày 30/11/2019.

Kết thúc chiến dịch Trường trạm Y tế xã tổng hợp báo cáo theo mẫu về Trung tâm Y tế trước ngày 10/12/2019 để tổng hợp báo cáo cấp trên.

Nhận được công văn này yêu cầu Trường trạm Y tế các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc đạt kết quả cao.

Nơi nhận:

- TIYT dự phòng tỉnh (để b/c);
- TICSSK sinh sản tỉnh (để b/c);
- Trạm Y tế xã, thị trấn (để t/h);
- Lưu VT.



Trịnh Thị Hương