

SỞ Y TẾ THANH HÓA
TTYT THIỆU HÓA

Số: 09/CV-TTYT

V/v tăng cường đảm bảo công tác
an toàn tiêm chủng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thiệu Hóa, ngày 16 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn.

Thực hiện công văn số 23/YTDP-KSBTN ngày 04/01/2019 của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng", nhằm đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng và chuyển đổi vắc xin DPT-VGB-Hib (ComBE Five) trên địa bàn huyện. Giám đốc Trung tâm Y tế Thiệu Hóa đề nghị Trưởng trạm y tế các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Rà soát lại toàn bộ quy trình thực hành tiêm chủng, thực hiện nghiêm túc công tác khám sàng lọc trước tiêm chủng, tuân thủ đúng chỉ định, chống chỉ định, tạm hoãn theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 2301/QĐ-BYT ngày 12/6/2015 về Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.
2. Tư vấn đầy đủ cho các bậc cha mẹ, người chăm sóc biết cách theo dõi, phát hiện phản ứng sau tiêm chủng đặc biệt vắc xin ComBE Five trong 1 - 2 ngày đầu sau tiêm chủng và chủ động thông báo cho cán bộ y tế về các phản ứng sau tiêm chủng để được hướng dẫn đúng cách xử trí tại nhà. Dưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất nếu có các biểu hiện bất thường về sức khỏe như: sốt cao, kích thích, quấy khóc dai dẳng, bú kém, lì bì, tím tái, khó thở....
3. Theo dõi trẻ sau tiêm chủng 30 phút tại trạm, sẵn sàng, chủ động xử trí ban đầu các trường hợp phản ứng phản vệ sau tiêm chủng theo thông tư 51/2017/BYT ngày 29/12/2017 về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. Phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh các tuyến trong việc xử trí cấp cứu kịp thời, vận chuyển các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng (nếu có).
4. Tăng cường truyền thông cho các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ và cộng đồng về việc chuyển đổi sử dụng vắc xin ComBE Five, tính an toàn của vắc xin, những phản ứng có thể xảy ra, theo dõi và chăm sóc trẻ sau tiêm.
5. Dặm bao các điều kiện tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin theo đúng quy định, lưu ý đối với vắc xin ComBE Five trước khi thực hiện tiêm chủng cần lắc kỹ lọ vắc xin trước khi sử dụng.

6. Kịp thời báo cáo các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chung về khoa KSD – HIV/AIDS Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hóa theo quy định.

7. Trạm y tế các xã, thị trấn báo cáo dự kiến vắc xin, vật tư bằng văn bản gửi về khoa KSD - HIV/AIDS và hộp thư điện tử: xuantiep59@gmail.com trước ngày 22 hàng tháng theo quy định.

Nhận được công văn này đề nghị Trường trạm y tế các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KSD.



Trịnh Thị Hương