

SỞ Y TẾ THANH HÓA
TTYT THIỆU HÓA

Số: 65 /TTYT - CV

V/v tăng cường các biện pháp
phòng chống bệnh bạch hầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thiệu Hóa, ngày 15 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Trạm Y tế các xã, thị trấn

Bệnh bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh qua đường hô hấp gây thành dịch và có tỉ lệ tử vong cao (theo WHO tỉ lệ tử vong từ 5-20% tùy từng vùng). Bệnh thường gặp ở trẻ em < 15 tuổi và cả những người lớn chưa có miễn dịch với bệnh do chưa được tiêm vắc xin đầy đủ. Hiện nay ở nước ta, bệnh bạch hầu đang có xu hướng gia tăng trở lại, gây dịch ở một số địa phương, nhất là các tỉnh khu vực Tây Nguyên; từ năm 2014 đến 2019 vẫn ghi nhận các trường hợp mắc và tử vong do bệnh bạch hầu. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, tại khu vực Tây Nguyên đã ghi nhận 78 ca bệnh bạch hầu (Đắk Nông 29 ca, Kon Tum 26 ca, Gia Lai 20 ca, Đắk Lắk 3 ca) trong đó có 3 trường hợp tử vong do bệnh gây ra.

Trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, từ năm 1995 trở lại đây chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh bạch hầu, nhưng trong những năm gần đây tỉ lệ tiêm vắc xin chứa thành phần bạch hầu ở một số xã chưa cao và chưa đồng đều. Vì vậy, nguy cơ mắc bệnh bạch hầu rất dễ xảy ra ở những trẻ nhỏ và cả những người lớn chưa được tiêm chủng đủ mũi vắc xin phòng bệnh.

Thực hiện Công văn số 2129/SYT-NVY ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Sở Y tế Thanh Hoá về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu. Để chủ động giám sát, phát hiện sớm và ngăn chặn bệnh bạch hầu không để dịch xảy ra và lây lan trên địa bàn huyện; Giám đốc Trung tâm Y tế Thiệu Hoá đề nghị Trưởng trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông về bệnh bạch hầu, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu theo khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế. Tích cực tuyên truyền về lợi ích và tính an toàn của việc tiêm chủng các loại vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho trẻ em và cả người lớn;

2. Tham mưu cho UBND xã/thị trấn thực hiện tốt các biện pháp Dự phòng phòng chống bệnh bạch hầu tại địa phương như: công tác vệ sinh môi trường, tiêm chủng vắc xin mở rộng và dịch vụ...Thực hiện các biện pháp giám sát, chẩn đoán phát hiện sớm, cách ly báo cáo các ca bệnh theo quy định theo Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

3. Rà soát những trẻ trong độ tuổi tiêm chủng vắc xin chứa thành phần bạch hầu còn thiếu mũi, thông báo đề gia đình đưa trẻ đi tiêm chủng bù mũi ngay trọng


tháng 7,8 năm 2020; cập nhật thông tin đầy đủ lịch sử tiêm chủng cho các đối tượng lên phần mềm hệ thống quản lý tiêm chủng quốc gia, thực hiện ghi chép báo cáo đầy đủ vào sổ quản lý tiêm chủng A2/YTCS theo quy định;

4. Cập nhật kiến thức chẩn đoán và điều trị bệnh bạch hầu theo hướng dẫn trong Quyết định số 2957/QĐ-BYT ngày 10/7/2020 (*bản đính kèm gửi vào mail các trạm*). Trạm trưởng chủ động tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên làm việc tại trạm về khám chẩn đoán và điều trị bệnh bạch hầu theo hướng dẫn trong quyết định nêu trên;

Nhận được công văn này, đề nghị Trưởng trạm y tế các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, liên hệ BS. Lê Mạnh Hùng, Trưởng khoa KSBT. SĐT: **0946187036** để được giải đáp.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện)
- Lưu: VT, PCDB.


BSCKI: Trịnh Thị Hương

KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH BẠCH HẦU CỦA CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG – BỘ Y TẾ

1. Đưa trẻ đi tiêm chủng tiêm vắc xin phối hợp phòng bệnh bạch hầu: ComBe Five hoặc DPT-VGB-Hib (SII), Td đầy đủ, đúng lịch.
2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.
3. Đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Hạn chế sử dụng điều hòa, đóng kín cửa phòng khi không thật cần thiết.
4. Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.
5. Người dân trong ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc điều trị và tiêm vắc xin phòng bệnh theo chỉ định và yêu cầu của cơ quan y tế.

Lịch tiêm chủng vắc xin SII hoặc ComBe Five trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng

Mũi 1: Tiêm khi trẻ được 2 tháng tuổi

Mũi 2: Sau mũi thứ nhất 1 tháng

Mũi 3: Sau mũi thứ hai 1 tháng

Mũi 4: Khi trẻ 18 tháng tuổi.